

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Nombre:</b> Captopril<br><b>Condición de venta:</b> con receta médica<br><b>Clasificación:</b> hipotensor<br><b>Disponible en:</b> | <b>Nombres de marca:</b> |
|---|--------------------------|

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**

**Excipientes:**

### 1.- ¿Para qué se usa?

Es un **inhibidor** de la **enzima convertidora de angiotensina** que se utiliza para el control de la **hipertensión arterial** y para el tratamiento de la **insuficiencia cardiaca**.

### 2.- Administración (oral)

#### - Rango y frecuencia

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Hipertensión arterial: 50-100 mg. una dos veces al día, aunque en casos severos de hipertensión a veces es adecuado comenzar el tratamiento con dosis de 150 mg. diarios, los que luego se reducen al rango normal de tratamiento.

Tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva: se comienza con dosis de 6.25 mg. y luego según evolución se va aumentando la dosis paulatinamente con monitoreo de la presión arterial.

#### - Consejo de cómo administrarlo

Lo debe tomar con el estomago vacío, cerca de una hora antes de comer.

#### - Uso prolongado

Debe mantener un constante control médico, además de una revisión regular de la **presión arterial**.

### 3.- Precauciones

#### - Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con captopril. En caso de falla renal a veces es necesario realizar un ajuste de dosis según prescripción médica.

#### - Consumo de alcohol

Debe evitar el consumo de alcohol mientras se encuentre en tratamiento con captopril, ya que, puede provocar un incremento en el efecto de la droga, o causar mareos y debilidad.

#### - Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

#### - Embarazo

Este medicamento puede causar daño al feto, su uso durante el embarazo está contraindicado. Si usted está embarazada debe hacérselo saber a su médico.

#### - Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede dañar al bebé.

#### - Lactantes y niños

No se recomienda su utilización en niños, a menos que su pediatra así lo señale.

#### - Precauciones especiales

Para evitar el riesgo de una caída brusca de su **presión arterial**, se recomienda iniciar el tratamiento con la dosis más baja; según indique su médico, y tomarlo de preferencia en la noche, sobre todo en pacientes ancianos.

Aunque la presión arterial esté controlada y se sienta bien no debe dejar de tomar el medicamento sin consultar a su médico.

Usted debe visitar periódicamente a su médico, para evaluar su presión y tratamiento

No interrumpa el tratamiento sin consultar a su médico.

Antes de hacerse algún tipo de cirugía, ya sea dental o de otro tipo debe decirle al médico a cargo o dentista que está en tratamiento con este medicamento.

#### **4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:**

Si ha presentado síntomas de alergia a captopril, benazepril, cilazapril, espirapril, fosinopril, lisinopril, perindopril, quinapril, ramipril y trandolapril.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

#### **5.- Interacciones**

##### - Medicamentos

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: suplementos de potasio, warfarina, medicamentos para el resfrío, alopurinol, glibenclamida, ácido acetilsalicílico y otros **analgésicos** y **antiinflamatorios** azatioprina, ciclosporina, clozapina, furosemida, hidroclorotiazida, probenecid, rifampicina y sales de litio.

##### - Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de enfermedades **autoinmunes** como **lupus eritematoso sistémico**, **diabetes mellitus**, **estenosis arterial renal**.

##### - Alimentos

Debe evitar consumir alimentos que contengan mucho potasio.

##### - Exámenes de laboratorio

Antes de practicarse algún examen de sangre y / o de orina debe avisar al médico a cargo que está en tratamiento con este medicamento, puede dar falsos positivos para detectar acetona en la orina.

#### **6.- Efectos adversos**

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico:

fiebre y escalofríos, dolor de garganta y ronquera, súbita dificultad para respirar, **inflamación** de la cara, boca o extremidades, fiebre, escalofríos, confusión, coloración

amarillenta de piel u ojos, picazón intensa, dolor en el pecho o palpitaciones, dolor abdominal.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: tos seca y persistente, mareos y dolores de cabeza, alteración en el gusto.

**7.- Sobredosis**

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: mareos, frío, calambres. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

**8.-Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas entre los 15-30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

No recomiende este medicamento a otra persona.