

Nombre: Cafeína - Paracetamol Condición de venta: sin receta médica Clasificación: antigripal Disponible en:	Nombres de marca:
---	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento es usado para el alivio temporal de dolores menores de cabeza, resfríos, dolores musculares, dentales y estados febriles.

2.- Administración (oral)

- Rango y frecuencia

Se utiliza en asociaciones de 20 a 40mg de cafeína y 400 a 650mg de paracetamol. Una dosis cada 8 horas.

No debe consumir más de 4 g. de paracetamol al día.

- Consejo de cómo administrarlo

Se aconseja tomarlo junto con las comidas y con un vaso de agua.

- Uso prolongado

No tome más de 7 días, si los síntomas persisten o empeoran debe consultar al médico, puede tener alguna complicación y necesitar otro medicamento.

3.- Precauciones

- Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe consultar a su médico antes de tomar este medicamento.

- Consumo de alcohol

Debe evitar consumir alcohol mientras se encuentre en tratamiento con este medicamento, ya que este paracetamol puede dañar su hígado y el alcohol aumenta este riesgo.

- Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a **imprevistos**. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- Embarazo

Es recomendable que usted consulte con el médico la conveniencia de usar este medicamento si está embarazada.

- Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su médico la conveniencia de usar este medicamento si está amamantando

Lactantes y niños

Estos pacientes son más sensibles a los efectos adversos del medicamento, la administración debe ser previa consulta al pediatra, quién le señalará la dosis a usar.

- Precauciones especiales

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico. Consulte a su médico antes de tomar este medicamento si es alérgico a algún medicamento, alimento, saborizante y / o edulcorante, o colorante.

Para prevenir problemas para dormir, no tome este medicamento después de las 18 horas o poco antes de ir a dormir.

Recuerde que este medicamento contiene un estimulante, la cafeína, evite tomar café en exceso.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a cafeína, y / o paracetamol.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

5.- Interacciones

- Medicamentos

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente antidiabéticos, otros analgésicos, antihistamínicos, antitusivos,, y en general si se encuentra en tratamiento con cualquier otro medicamento, ya que el consumo de este antigripal puede alterar el efecto de otros medicamentos y causarle daño a su salud.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de **hipertensión arterial** u otra afección cardiovascular, cuadros ansiosos, **agorafobia**, ataques de pánico, insomnio, enfermedad renal, enfermedad hepática, **úlceras gastroduodenal** o historia de haberla presentado, alcoholismo.

- Exámenes de laboratorio

Si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico : ojos o piel amarilla, náuseas, vómitos, dificultad para respirar, sudoración, orina coloreada o turbia, manchas o prurito (picazón) o moretones en la piel, palidez o debilidad, dolor de la parte inferior de la espalda, disminución de la cantidad de orina, orina oscura o con sangre, hemorragias inusuales, deposiciones negras o con sangre, vértigos, taquicardia, irritabilidad, nerviosismo, insomnio, dificultad para hablar, náuseas, diarrea, vómitos.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o

se intensifican: dificultad o dolor para orinar, mareos leves, náuseas o vómitos, dolor estomacal, nerviosismo, palidez, irritabilidad.

7. - Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: vómitos, náuseas, falta de apetito, dolor estomacal. Puede además presentarse salivación excesiva.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8. - Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.