

<b>Nombre:</b> Simeticona <b>Condición de venta:</b> sin receta médica <b>Clasificación:</b> antiflatulento <b>Disponible en:</b>	<b>Nombres de marca:</b>
--	--------------------------

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente

- **Composición y presentación:**
- **Principio Activo:**
- **Excipientes:**

#### 1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento está indicado en el alivio del dolor en el tracto gastrointestinal, causado por exceso de gases.

#### 2.- Administración (oral)

##### - Rango y frecuencia

Adultos: 60 a 125 mg 4 veces al día.

Dosis máxima: 500 mg al día.

##### - Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda tomar el medicamento luego de las comidas y antes de ir a dormir.

##### - Uso prolongado

Si luego de un par de días sus síntomas persisten o aumentan debe consultar con su médico, ya que el medicamento puede estar ocultando una enfermedad grave.

#### 3.- Precauciones

##### - Mayores de 60 años

No existe recomendación especial para los ancianos.

##### - Manejo de vehículos

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

##### - Embarazo

Es poco probable que el uso de este medicamento durante el embarazo cause daño en el feto, ya que simeticona no se absorbe a través del intestino.

##### - Lactancia

No se ha reportado que el uso de este medicamento durante la lactancia cause daño en el niño.

##### - Lactantes y niños

No se ha observado que simeticona cause problemas en niños, sin embargo, el uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra. No se recomienda su uso para el tratamiento de cólicos .

- **Precauciones especiales**

Se recomienda moverse o salir a caminar para estimular la eliminación de gases.

**4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:**

Si ha presentado síntomas de alergia a simeticona.

Si ha presentado alergia a algún excipiente de la formulación.

**5.- Interacciones**

- **Medicamentos**

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, a pesar de que no se espera que simeticona interfiera con la acción de otros medicamentos.

- **Enfermedades**

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, **cardiovascular** o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

- **Alimentos**

Debe evitar ingerir alimentos que aumenten la formación de gas, como repollo, granos, legumbres, bebidas gaseosas, etc.

**6.- Efectos adversos**

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: síntomas de hipersensibilidad como dificultad para respirar, **rash**, **urticaria**, inflamación de ojos, boca, lengua.

- **Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: eliminación excesiva de gases y flatulencia.

**7.- Sobredosis**

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: síntomas de hipersensibilidad como dificultad para respirar, **rash**, **urticaria**, inflamación de ojos, boca, lengua.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la **intoxicación** y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

**8.-Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico**

No recomiende este medicamento a otra persona.

